



最新病蟲害警報

首頁 > 植物保護資訊 > 最新病蟲害警報 > 日夜溫差大，籲請農友適時防範葉稻熱

日夜溫差大，籲請農友適時防範葉稻熱

目前高屏地區水稻插秧已接近尾聲，早植田區甚至已進入分蘖期。由於高屏地區近來日夜溫差大，且田區的秧蘖已現稻熱病，因此，高雄區農業改良場 (以下簡稱高雄農改場) 籲請農友注意田間稻熱病發生情形，掌握防治時機及勿過量施用氮肥的原則，避免稻熱病菌密度升高，有利於提升防治成效。

高雄農改場戴順發場長表示，稻熱病好發於日夜溫差大、相對溼度高且晨間露水明顯的環境，施用高量氮肥、密植且通風不良的稻田，更容易嚴重發病。葉稻熱病若未及時防治，則可能於水稻抽穗後造成穗稻熱病，導致產量與品質嚴重受損。防治作業應掌握預防勝於治療的原則，若秧蘖上已出現稻熱病斑，應立即選用6%撲殺熱粒劑(30公斤/公頃)或其他核准藥劑進行預防。若稻株已進入發病初期，則可選用核准藥劑，例如41.7%三賽唑水懸劑(1,500倍)、25%克熱淨溶液(1,200倍)或5%嘉賜黴素可施性粉劑(3,000倍)等藥劑予以防治，用藥資訊可參考

農藥資訊服務網 [或](#) [本場作物安全用藥表單](#)。

用藥時，應注意用藥安全，遵照規範使用核准藥劑及其施用濃度，以避免抗藥性與

藥害發生。此外，在肥培管理方面，氮肥切勿過重施用，以減輕受害程度。農友在稻熱病防治上若有任何問題，可多加利用病蟲害診斷服務專線 08-7389060，或逕洽高雄農改場植物保護研究室，研究人員將全力提供協助。



農友可檢視田邊秧蘖發病情形，若已出現病斑，可即時進行預防。



水稻葉稻熱病病斑

[回上一頁](#)

[https://www.kdais.gov.tw/theme_data.php?
theme=news&sub_theme=warning&id=9797](https://www.kdais.gov.tw/theme_data.php?theme=news&sub_theme=warning&id=9797)
2024/02/06